



Numerické derivování

Studijní materiály

Pro listování dokumentem **NE**používejte kolečko myši
nebo zvolte možnost *Full Screen*.

Obsah

Úvod

3

Příklad: zadány DVA body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: -0,032) 3

Příklad: zadány TŘI body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: -0,032) 6

Příklad: zadány ČTYŘI body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: -0,132) 10

Příklad: zadáno PĚT bodů (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: -0,332) 14

Vzorce pro odhad hodnoty derivace v uzlovém bodě

19

Příklad 20

Použitá literatura

22

Úvod

V praxi se stává, že o nějaké funkci víme jen to, že nabývá několika hodnot, které jsme získali experimentálně. Přesto požadujeme znát i hodnoty derivace této funkce alespoň v některých (ne nutně experimentálně zjištěných) bodech. Nezbývá, než potřebné hodnoty derivace nějak odhadnout. Nejčastěji to provádíme tak, že zadanými body proložíme interpolační mnohočlen a hledané derivace nahradíme derivacemi tohoto mnohočlenu.

Uvedený postup si ukažme na jednoduchém příkladu, který je schválňován volen tak, aby bylo možné výsledky získané interpolačními mnohočleny porovnat s přesnou hodnotou derivace v daném bodě.

Příklad: jsou zadány dva uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Odhadněte hodnotu derivace *neznámé funkce* $f(x)$ pro $x = -1,5$
 /tedy $f'(-1,5) = ?/$ pouze na základě těchto informací:

x	\parallel	-2	\parallel	-1
$f(x)$	\parallel	-0,6	\parallel	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Lagrangeově tvaru:

Úvod

V praxi se stává, že o nějaké funkci víme jen to, že nabývá několika hodnot, které jsme získali experimentálně. Přesto požadujeme znát i hodnoty derivace této funkce alespoň v některých (ne nutně experimentálně zjištěných) bodech. Nezbývá, než potřebné hodnoty derivace nějak odhadnout. Nejčastěji to provádíme tak, že zadanými body proložíme interpolační mnohočlen a hledané derivace nahradíme derivacemi tohoto mnohočlenu.

Uvedený postup si ukažme na jednoduchém příkladu, který je schválňován volen tak, aby bylo možné výsledky získané interpolačními mnohočleny porovnat s přesnou hodnotou derivace v daném bodě.

Příklad: jsou zadány dva uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Odhadněte hodnotu derivace *neznámé funkce* $f(x)$ pro $x = -1,5$
 /tedy $f'(-1,5) = ?/$ pouze na základě těchto informací:

x	-2	-1
$f(x)$	-0,6	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Lagrangeově tvaru:

$$L(x) = -0,6 \cdot \frac{x - (-1)}{-2 + 1} + 0 \cdot \frac{x - (-2)}{-1 + 2} = 0,6 \cdot (x + 1) \quad \Rightarrow \quad L'(x) = (0,6x + 0,6)' = 0,6$$

Úvod

V praxi se stává, že o nějaké funkci víme jen to, že nabývá několika hodnot, které jsme získali experimentálně. Přesto požadujeme znát i hodnoty derivace této funkce alespoň v některých (ne nutně experimentálně zjištěných) bodech. Nezbývá, než potřebné hodnoty derivace nějak odhadnout. Nejčastěji to provádíme tak, že zadanými body proložíme interpolační mnohočlen a hledané derivace nahradíme derivacemi tohoto mnohočlenu.

Uvedený postup si ukažme na jednoduchém příkladu, který je schválňován volen tak, aby bylo možné výsledky získané interpolačními mnohočleny porovnat s přesnou hodnotou derivace v daném bodě.

Příklad: jsou zadány dva uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Odhadněte hodnotu derivace neznámé funkce $f(x)$ pro $x = -1,5$
/tedy $f'(-1,5) = ?/$ pouze na základě těchto informací:

x	-2	-1
$f(x)$	-0,6	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Lagrangeově tvaru:

$$L(x) = -0,6 \cdot \frac{x - (-1)}{-2 + 1} + 0 \cdot \frac{x - (-2)}{-1 + 2} = 0,6 \cdot (x + 1) \quad \Rightarrow \quad L'(x) = (0,6x + 0,6)' = 0,6$$

A potom: $f'(-1,5) \approx L'(-1,5) = 0,6$. Přičemž $f'(-1,5) = -\frac{4 \cdot (-1,5)}{[1+(-1,5)^2]^2} = 0,568\,047$,

protože $\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)' = \frac{(1-x^2)'(1+x^2) - (1-x^2)(1+x^2)'}{(1+x^2)^2} = \frac{-2x \cdot (1+x^2) - (1-x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$

Příklad: jsou zadány tři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe tři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ pouze na základě těchto informací:

x	-2	-1	0
$f(x)$	-0,6	0	1

Řešení Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

Příklad: jsou zadány tři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe tři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ pouze na základě těchto informací:

x	-2	-1	0
$f(x)$	$-0,6$	0	1

Řešení Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{ccccccc} & -2 & & -1 & & 0 & \\ \hline & \textcolor{red}{-0,6} & & 0 & & & 1 \\ & \frac{0 - (-0,6)}{-1 - (-2)} = \textcolor{red}{0,6} & & & \frac{1 - 0}{0 - (-1)} = 1 & & \\ & & \frac{1 - 0,6}{0 - (-2)} = \textcolor{red}{0,2} & & & & \end{array}$$

Příklad: jsou zadány tři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe tři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ pouze na základě těchto informací:

x	-2	-1	0
$f(x)$	-0,6	0	1

Řešení Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{cccc}
 & -2 & -1 & 0 \\
 \hline
 & \color{red}{-0,6} & 0 & 1 \\
 & \frac{0 - (-0,6)}{-1 - (-2)} = \color{red}{0,6} & \frac{1 - 0}{0 - (-1)} = 1 \\
 & \frac{1 - 0,6}{0 - (-2)} = \color{red}{0,2} &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 N(x) &= -0,6 + 0,6 \cdot [x - (-2)] + 0,2 \cdot (x+2) \cdot [x - (-1)] = -0,6 + 0,6 \cdot (x+2) + 0,2 \cdot (x^2 + x + 2x + 2) = \\
 &= 0,2x^2 + [0,6 + 0,2 \cdot 3] \cdot x + (-0,6 + 0,6 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2) = 0,2x^2 + 1,2x + 1
 \end{aligned}$$

Příklad: jsou zadány tři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,032$)

Máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe tři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ pouze na základě těchto informací:

x	-2	-1	0
$f(x)$	$-0,6$	0	1

Řešení Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{ccccccc} & -2 & & -1 & & 0 & \\ \hline & -0,6 & & 0 & & 1 & \\ & \frac{0 - (-0,6)}{-1 - (-2)} = 0,6 & & \frac{1 - 0}{0 - (-1)} = 1 & & & \\ & & \frac{1 - 0,6}{0 - (-2)} = 0,2 & & & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} N(x) &= -0,6 + 0,6 \cdot [x - (-2)] + 0,2 \cdot (x+2) \cdot [x - (-1)] = -0,6 + 0,6 \cdot (x+2) + 0,2 \cdot (x^2 + x + 2x + 2) = \\ &= 0,2x^2 + [0,6 + 0,2 \cdot 3] \cdot x + (-0,6 + 0,6 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2) = 0,2x^2 + 1,2x + 1 \end{aligned}$$

$$N'(x) = (0,2x^2 + 1,2x + 1)' = 0,4x + 1,2$$

$$f'(-1,5) \approx N'(-1,5) = 0,4 \cdot (-1,5) + 1,2 = 0,6$$

Což je naprosto stejný výsledek, jako když jsme měli zadány pouze dva body. Odhad hodnoty derivace se v tomto případě nezhoršil.

Zkusme proto přidat další bod, zda dostaneme lepší odhad.

Příklad: jsou zadány čtyři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,132$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe čtyři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	-0,6	0	1	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

Příklad: jsou zadány čtyři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,132$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe čtyři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	-0,6	0	1	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & -2 & & -1 & & 0 & & 1 & \\
 \hline
 & -0,6 & & 0 & & 1 & & 0 & \\
 & 0,6 & & & 1 & & & & \\
 & & 0,2 & & & & & & \\
 & & & \frac{-1-1}{1-(-1)} = -1 & & & & & \\
 & & & & \frac{-1-0,2}{1-(-2)} = -0,4 & & & & \\
 \end{array}$$

Příklad: jsou zadány čtyři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,132$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe čtyři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	-0,6	0	1	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{cccccc}
 & -2 & & -1 & & 0 & & 1 \\
 & \hline
 & -0,6 & & 0 & & 1 & & 0 \\
 & & 0,6 & & 1 & & & \\
 & & & 0,2 & & & & \\
 & & & & \frac{-1-1}{1-(-1)} = -1 & & \\
 & & & & & & \\
 & & & & \frac{-1-0,2}{1-(-2)} = -0,4 & &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 N(x) &= 0,2x^2 + 1,2x + 1 - 0,4 \cdot (x+2) \cdot (x+1) \cdot (x-0) = \\
 &= 0,2x^2 + 1,2x + 1 - 0,4 \cdot (x^3 + 3x^2 + 2x) = -0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1
 \end{aligned}$$

Příklad: jsou zadány čtyři uzlové body (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,132$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe čtyři hodnoty.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	-0,6	0	1	0

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{cccccc}
 & -2 & & -1 & & 0 & & 1 \\
 & \hline
 & -0,6 & & 0 & & 1 & & 0 \\
 & & 0,6 & & 1 & & & \frac{0-1}{1-0} = -1 \\
 & & & 0,2 & & \frac{-1-1}{1-(-1)} = -1 & & \\
 & & & & \frac{-1-0,2}{1-(-2)} = -0,4 & & &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 N(x) &= 0,2x^2 + 1,2x + 1 - 0,4 \cdot (x+2) \cdot (x+1) \cdot (x-0) = \\
 &= 0,2x^2 + 1,2x + 1 - 0,4 \cdot (x^3 + 3x^2 + 2x) = -0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1 \\
 N'(x) &= (-0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1)' = -1,2x^2 - 2x + 0,4 \\
 f'(-1,5) &\approx N'(-1,5) = -1,2 \cdot (-1,5)^2 - 2 \cdot (-1,5) + 0,4 = 0,7
 \end{aligned}$$

Dostali jsme nepatrně horší výsledek než v předchozích případech. Zkusme tedy přidat další bod.

Příklad: je zadáno pět uzlových bodů (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,332$)

Opět máme stejnou *neznámou funkci f*, ale nyní známe pět hodnot.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-0,6	0	1	0	-0,6

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

Příklad: je zadáno pět uzlových bodů (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,332$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe pět hodnot.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-0,6	0	1	0	-0,6

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{cccccc}
 -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\
 \hline
 -0,6 & 0 & 1 & 0 & -0,6 \\
 0,6 & 1 & -1 & \frac{-0,6 - 0}{2 - 1} = -0,6 \\
 0,2 & -1 & \frac{-0,6 - (-1)}{2 - 0} = 0,2 \\
 -0,4 & & \frac{0,2 - (-1)}{2 - (-1)} = 0,4 \\
 \frac{0,4 - (-0,4)}{2 - (-2)} = 0,2 & & & & &
 \end{array}$$

Příklad: je zadáno pět uzlových bodů (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,332$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe pět hodnot.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-0,6	0	1	0	-0,6

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{cccccc}
 -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\
 \hline
 -0,6 & 0 & 1 & 0 & -0,6 \\
 0,6 & 1 & -1 & \frac{-0,6-0}{2-1} = -0,6 \\
 0,2 & -1 & \frac{-0,6-(-1)}{2-0} = 0,2 \\
 -0,4 & \frac{0,2-(-1)}{2-(-1)} = 0,4 \\
 \frac{0,4-(-0,4)}{2-(-2)} = 0,2
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 N(x) &= -0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1 + 0,2 \cdot (x+2) \cdot (x+1) \cdot (x-0) \cdot (x-1) = \\
 &= -0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1 + 0,2 \cdot (x^2 + 2x) \cdot (x^2 - 1) = \\
 &= 0,2x^4 - 1,2x^2 + 1
 \end{aligned}$$

Příklad: je zadáno pět uzlových bodů (funkce $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$, chyba: $\Delta \doteq -0,332$)

Opět máme stejnou neznámou funkci f , ale nyní známe pět hodnot.

Odhadněte hodnotu derivace $f'(-1,5)$ když znáte:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-0,6	0	1	0	-0,6

Řešení: Zadanými body proložíme interpolační mnohočlen v Newtonově tvaru:

$$\begin{array}{cccccc}
 -2 & -1 & 0 & 1 & & 2 \\
 \hline
 -0,6 & 0 & 1 & 0 & & -0,6 \\
 0,6 & 1 & & -1 & \frac{-0,6-0}{2-1} = -0,6 \\
 0,2 & & -1 & \frac{-0,6-(-1)}{2-0} = 0,2 \\
 -0,4 & & & \frac{0,2-(-1)}{2-(-1)} = 0,4 \\
 \frac{0,4-(-0,4)}{2-(-2)} = 0,2 & & & & &
 \end{array}$$


$$\begin{aligned}
 N(x) &= -0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1 + 0,2 \cdot (x+2) \cdot (x+1) \cdot (x-0) \cdot (x-1) = \\
 &= -0,4x^3 - x^2 + 0,4x + 1 + 0,2 \cdot (x^2 + 2x) \cdot (x^2 - 1) = \\
 &= 0,2x^4 - 1,2x^2 + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 N'(x) &= (0,2x^4 - 1,2x^2 + 1)' = 0,8x^3 - 2,4x \\
 f'(-1,5) &\approx N'(-1,5) = 0,8 \cdot (-1,5)^3 - 2,4 \cdot (-1,5) = 0,9
 \end{aligned}$$


V tomto případě je námi odhadnutá směrnice tečny méně přesná, jak v předchozích případech.

Nemůžeme tedy říci, že vždy při větším počtu zadaných hodnot, dostaneme přesnější výsledek.


Grafy interpolované funkce a jednotlivých interpolačních mnohočlenů:




$$f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$




$$L_1(x) = 0,6 x + 0,6$$



$$N_2(x) = 0,2 x^2 + 1,2 x + 1$$



$$N_3(x) = -0,4 x^3 - x^2 + 0,4 x + 1$$



$$N_4(x) = 0,2 x^4 - 1,2 x^2 + 1$$

Vzorce pro odhad hodnoty derivace v uzlovém bodě

Pokud chceme odhadnout hodnotu derivace v uzlovém bodě (nebo uprostřed dvou uzlových bodů), nemusíme sami sestrojovat interpolační mnohočlen, ale můžeme využít následujících vzorců, které již byly odvozeny (například [2, str. 71 a násl.]) na základě interpolačních mnohočlenů.

$$(1) \quad f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{známe-li hodnoty pro } x, x+h$$

$$(2) \quad f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \quad \text{známe-li hodnoty pro } x-h, x$$

$$(3) \quad f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad \text{známe-li hodnoty pro } x-h, x+h$$

$$(4) \quad f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \quad \text{známe-li hodnoty pro } x-h, x, x+h$$

Odhadněte $f'(-1)$ je-li dáno:

x	-2	-1	0
$f(x)$	-0,6	0	1

Známe-li $\begin{array}{c|c} -2 & -1 \\ \hline -0,6 & 0 \end{array}$ použijeme pro odhad $f'(-1)$ vzorec (2), kde $h = 1$.

Potom
$$f'(-1) \approx \frac{f(-1) - f(-2)}{1} = \frac{f(-1) - (-0,6)}{1} = \frac{0 - (-0,6)}{1} = 0,6$$

Známe-li $\begin{array}{c|c} -2 & 0 \\ \hline -0,6 & 1 \end{array}$ použijeme pro odhad $f'(-1)$ vzorec (3), kde $h = 1$.

Potom
$$f'(-1) \approx \frac{f(-1+1) - f(-1-1)}{2 \cdot 1} = \frac{f(0) - f(-2)}{2} = \frac{1 - (-0,6)}{2} = 0,8$$

Známe-li $\begin{array}{c|c} -1 & 0 \\ \hline 0 & 1 \end{array}$ použijeme pro odhad $f'(-1)$ vzorec (1), kde $h = 1$.

Potom
$$f'(-1) \approx \frac{f(-1+1) - f(-1)}{1} = \frac{f(0) - f(-1)}{1} = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

Odhadněte $f''(-1)$ je-li dáno:

x	-2	-1	0
$f(x)$	-0,6	0	1


Pro odhad $f''(-1)$ použijeme vzorec (4), kde $h = 1$.

$$\text{Potom } f''(-1) \approx \frac{f(-1+1)-2f(-1)+f(-1-1)}{1^2} = \frac{f(0) - 2f(-1) + f(-2)}{1} = 1 - 2 \cdot 0 + (-0,6) = 0,4$$

Závěrečná poznámka

Z teorie numerického derivování vyplývá, že jde o velice riskantní operaci. Výsledky mohou být zatíženy velkou chybou, která je většinou tím větší, čím vyšší řád derivace se pokoušíme numericky najít. Je to způsobeno charakteristickou vlastností interpolačních mnohočlenů: **vlněním** (obrázek převzat z [5]). A my hodnoty derivací počítáme (odhadujeme) pomocí interpolačních mnohočlenů.

Z uvedeného důvodu jsme se raději vzorcem pro odhad chyby vůbec nezabývali.



Obr. 4.3: Graf funkce $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ a interpolačního polynomu $L(x)$

Obejít tuto nepříjemnost při výpočtu (možnost výskytu velké chyby při použití metody založené na interpolaci) je možné předchozím vyhlazením průběhu funkce. Jestliže například dané hodnoty (se kterými pracujeme) nějaké funkce $f(x)$ byly získány experimentálně, a jsou tedy zatíženy určitými nezanedbatelnými chybami, je lépe místo interpolačního mnohočlenu $I(x)$ nejprve aproximovat daná data ***vhodnou funkcí*** (nejenom mnohočlenem) $A(x)$ například metodou nejmenších čtverců a pak teprve nahradit derivace funkce $f(x)$ příslušnými derivacemi funkce $A(x)$.

Použitá literatura

- [1] ČERNÁ, R., MACHALICKÝ, M., VOGEL, J., ZLATNÍK, Č. *Základy numerické matematiky a programování*. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, Celostátní vysokoškolská učebnice pro strojní, elektrotechnické a stavební fakulty vysokých škol technických, Praha 1987, 448 s.
- [2] DALÍK, J. *Matematika IV, Numerická analýza*. Brno : Fakulta stavební VUT, 2009, 130 s. [Dostupné z adresy:] (<https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp>)
- [3] DIBLÍK, J., BAŠTINEC, J. *Matematika IV*. [skriptum] Brno : VUT, Fakulta elektrotechnická, 1991, 120 s. [Dostupné z adresy:] (http://rschwarz.wz.cz/fast/DB_skripta.pdf)
- [4] FAJMON, B., RŮŽIČKOVÁ, I. *Matematika 3*. Brno : Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, [on line] (<http://www.umat.feec.vutbr.cz/~hlavicka/skripta/matematika3.pdf>)
- [5] KUBEN, J., RAČKOVÁ, P. *Numerické metody*. Univerzita obrany, [Dostupné z adresy:] (<https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=1169>)
- [6] KUČERA, R., MORÁVKOVÁ, Z. *Numerická matematika*. Vysoká škola báňská — Technická Univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-3893-9. [on line] (<http://mdg.vsb.cz/portal/nm/nm.pdf>)

- [7] POSPÍŠIL, I., VONDRAK, V. *Numerické metody I.* Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 191 s. [on line]
[\(http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/numerické_metody.pdf\)](http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/numerické_metody.pdf)
- [8] PŘIKRYL, P. *Numerické metody matematické analýzy.* Praha : Státní nakladatelství technické literatury, Matematika pro vysoké školy technické, sešit XXIV, Praha, 1985, 192 s.
- [9] RŮŽIČKOVÁ, I., HLAVIČKA, R. *Numerické metody.* Brno : Fakulta strojního inženýrství VUT, [on line]
[\(http://physics.ujep.cz/~jskvor/NME/DalsiSkripta/Numerika.pdf\)](http://physics.ujep.cz/~jskvor/NME/DalsiSkripta/Numerika.pdf)
- [10] STREČKO, O. *Desať kapitol z numerických, grafických a iných metod.* Bratislava : Alfa – Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1978, 1. vydanie, 328 s.